漫談 神經內分泌腫瘤 (NET)

Dr. Chia-Jui Yen M.D Ph.D
(顏家瑞)

Department of Oncology
National Cheng Kung
University Hospital

什麼是神經內分泌腫瘤?

- 一種上皮細胞腫瘤，具有明顯的神經內分泌細胞的分化。
- 細胞內充滿分泌顆粒，可分泌具生物活性的激素。
- 在1907年，首先有學者描述這樣的腫瘤，取名為類癌瘤(carcinoid)。
- 可以出現在很多器官: 胃腸道、胰臟、甲狀腺、肺等。
- 良性 / 惡性。

2003/10：在一次例行的腎臟和輸尿管檢查中，醫生無意中發現了胰臟腫瘤。認為是胰島細胞或胰腺神經內分泌腫瘤。

未手術，進行替代療法（素食、針灸、草藥治療、果汁排毒、清空腸道等，還求助過通靈師）

2004/9：手術，癌細胞轉移至肝臟

2005：公開病情

2009：肝臟移植，腹膜已轉移

2010：惡化

2011/10：去世

Wilko Johnson 音樂家

Nick Robinson BBC 播報員

Dave Thomas

Dag Kittlaus Siri 共同創立人

美國盛行率

Increasing Incidence of pNET

CI, confidence interval; pNET, pancreatic neuroendocrine tumors.

Source: Surveillance, Epidemiology, and End Results (SEER) Program (www.seer.cancer.gov) SEER*Stat Database: Incidence - SEER 18 Regs Research Data, Nov 2011 Sub (1973-2010) <Katrina/Rita Population Adjustment> - Linked To County Attributes - Total U.S., 1969-2010 Counties, National Cancer Institute, DCCPS, Surveillance Research Program, Surveillance Systems Branch, released April 2013, based on the November 2012 submission.

NET incidence rate increase 5 times in past 12 years in Taiwan

- Based on Taiwan registry data from **1996 to 2008**, NHRI Taiwan has found NET incidence rate increase 5 times in past 12 years

神經內分泌腫瘤 - 一種會分泌荷爾蒙的惡性腫瘤

什麼是 內分泌系統

- 人體分泌荷爾蒙的細胞系統
- 與神經系統相輔相成
- 將分泌出的荷爾蒙透過血液帶到身體各處
- 影響人體生長發育、各種代謝，與各種細胞與器官的功能

什麼是 神經內分泌腫瘤

- 神經內分泌系統中的神經內分泌細胞轉化成的腫瘤 (NET, Neuroendocrine Tumor)
- 分泌過量的荷爾蒙，導致患者產生相關症狀
- 有部分患者不會有腫瘤過量分泌荷爾蒙引起的症狀，或腫瘤本身沒有明顯的荷爾蒙分泌
- 疾病成因不明

神經內分泌瘤細胞

會同時分泌內分泌賀爾蒙及神經傳導物質

NE - Cell

類癌綜合症狀 (carcinoid syndrome)

器官	症狀	發生率	活性因子
皮膚	臉潮紅	85	kinins, histamine (組織胺), kallikreins, other
	微血管擴張	25	
	發紺	18	Excess tryptophan (色胺酸) metabolism
	糙皮病	7	
胃腸道	腹瀉、腸絞痛	75 - 85	serotonin (血清素)
心臟	瓣膜相關	40	Serotonin (血清素)
	右心左心		
呼吸道	支氣管緊縮		未知

神經內分泌瘤常發生的位置

35,825 cases

In the remaining 15% the primary tumour site was unknown

2.National Comprehensive Cancer Network® Clinical Practice Guidelines in Oncology. Neuroendocrine Tumor. Version 3. June 13, 2017.

3.Yao JC, Hassan M, Phan A, et al. J Clin Oncol. 2008 Jun 20;26(18):3063-72.

神經內分泌腫瘤的症狀

因不同原發部位分泌不同的荷爾蒙，而有不同的症狀

- 🔥 臉部潮紅
- 🔥 盜汗
- 🔥 頭痛
- 🔥 高血壓

- 🔥 心臟疾病
- 🔥 心悸
- 🔥 體重減輕
- 🔥 貧血
- 🔥 低血糖、高血糖

- 🔥 皮膚起紅疹
- 🔥 皮膚炎
- 🔥 皮膚病變、色素沈著
- 🔥 出現無痛性紅色結節

- 🔥 氣喘
- 🔥 喘鳴聲
- 🔥 氣管痙攣
- 🔥 呼吸困難

- 🔥 胃潰瘍
- 🔥 腹瀉
- 🔥 腸道出血、血便
- 🔥 腹痛
- 🔥 胃灼熱
- 🔥 吸收不良

- 🔥 近端肢體肌病變

神經內分泌腫瘤十大警訊

沒有警覺就無法察覺

盜汗

熱潮紅

發熱

低血糖嚴重飢餓感

心悸

皮膚炎

慢性腹瀉

氣喘

反覆性胃潰瘍

咳嗽

過去，症狀不易分辨常導致延遲確診

患者發生
症狀
尋求基本
治療

患者
腹部症狀模糊

- 📍 被診斷為**腸躁症**
- 📍 轉介到其他科別作**症狀緩解**

轉介到
其他科別

患者
症狀無法妥善控制
尋求多科合作

- 📍 依然**無法**做出
清楚的診斷

安排到
腸胃科或
其他專科
進行影像
檢查

患者
進行影像診斷

- 📍 因腸胃道手術或內視鏡檢查而意外發現
- 📍 轉介到外科進行切片檢查

外科
切片檢查
或腫瘤手術
進行
正確診斷

切片檢查
提供正確診斷

- 📍 患者留在外科，或是轉到腫瘤科
- 📍 根據病史，症狀及期別**進行治療**

預估診斷時間：5 ~ 7 年

症狀與普通疾病 --傻傻分不清

神經內分泌腫瘤會依腫瘤部位、分泌荷爾蒙的不同，而顯現不同的症狀。醫學上用「斑馬」形容，就像是聽到馬蹄聲時，會讓人直覺來的是馬，但有可能是斑馬，用以比喻神經內分泌腫瘤難以診斷、易和其他疾病混淆。許多患者在不了解疾病的狀況下，可能以為自己只是感冒、腸胃不好，而錯過了治療時間，至醫療院所時才發現已經轉移或是控制不佳。

1940年代馬里蘭州的醫學教授Dr. Theodore Woodward有句名言：「聽到馬蹄聲要先想到馬，別先想斑馬！——When you hear hoofbeats, think of horses not **zebras**！」

但是,在很罕見的情況下,會是斑馬!

危險因子

- 目前仍不確定原因
- 年齡：好發於40~60 歲。
- 性別：女性比男性多。
- 種族：黑人發生比例較高。
- 家族史：有些與遺傳有關。
- 免疫功能抑制：愛滋病人由於免疫系統降低，有較高風險。
- 砷：長期暴露在砷的環境，可能會增加罹患風險。

什麼檢查可診斷並追蹤神經內分泌腫瘤？

如何診斷神經內分泌腫瘤

- 影像學：

胸部X光，腹部超音波，電腦斷層/核磁共振攝影，核子醫學檢查Octreo Scan，生長抑素受體閃爍造影SRS，I-131 MIBG，骨頭掃描等。

- 切片檢查 (最重要!!!)。

- 尿液檢查：**5-HIAA (5- 氫氧靛基醋酸，5-hydroxyindoleacetic acid)**：血清素分解。

假陽性: 香蕉、鳳梨、奇異果、核桃果仁、蕃茄、胡桃、酪梨，止痛劑如泰諾、含水楊酸的阿斯匹林，含Guaifenesin 的咳嗽藥和L-dopa 等。

神經內分泌腫瘤的檢查方式

臨床症狀檢查

問診：

- 📍 有什麼症狀？
- 📍 什麼時候開始的？
- 📍 症狀有多常出現？

找出可能症狀，如：

- 📍 間歇性的低血糖現象
- 📍 持續腹瀉並臉部潮紅
- 📍 覆發性且難治的十二指腸潰瘍

CgA = Chromogranin A; **5-HIAA** = 5-hydroxy-3-indoleacetic acid

抽血檢查

抽血檢查：

檢測可幫助診斷與追蹤的**生物標記**

- 📍 嗜鉻粒蛋白A (CgA)
- 📍 胃泌素
- 📍 胰島素
- 📍 升糖素
- 📍 血清素
- 📍 5-HIAA 濃度

檢測指數是否正常？

影像學檢查

胃腸內視鏡

內視鏡超音波

電腦斷層或核磁共振攝影

核醫檢查

- 📍 核醫造影檢查
- 📍 正子斷層掃描

顯示各個器官組織的影像，確認腦腫瘤的大小、位置與侵入性

切片檢查

從您的**腫瘤、器官或組織**中取出一小部份的樣本

讓病理醫師能在顯微鏡下評估細胞是否有疾病，以利正確診斷

12.Neuroendocrine Tumor - Diagnosis by Cancer.Net <http://www.cancer.net/cancer-types/neuroendocrine-tumor/diagnosis>. Accessed 9/14/2017.

13.Neuroendocrine Tumor Tests by WebMD. <http://www.webmd.com/cancer/neuroendocrine-tumors-tests#1>. Accessed 9/14/2017.

電腦斷層攝影

- 🔦 是利用無數的**X光射線**穿透人體，取得影像，再由電腦組成二度空間的影像
- 🔦 可偵測**腫瘤的大小**與對周圍組織的**侵入性**

核磁共振攝影

- 🔦 將人體放入一個大型的強烈磁場，藉由體內水分子重新排列時所釋放出的能量訊號，而呈現各個器官組織的影像
- 🔦 可用來確**腫瘤的大小、位置與侵入性**

胰神經內分泌瘤

- 診斷(1)：
腹部電腦斷層
腹部核磁共振

具血管分布豐富的特點

胃腸內視鏡

- 藉由一條前端設有鏡頭且可彎曲的細管，讓醫師檢查您的食道、胃、小腸與大腸
- 可檢查腸胃道是否有**病變**，必要時可進行**組織取樣**

下消化道內視鏡

上消化道內視鏡

內視鏡超音波

- 結合內視鏡與超音波的一種影像學檢查，從消化道內部做超音波掃瞄
- 可鑑別病灶部位的本質，**侵犯的深度**及**淋巴結轉移的程度**
- 全程檢查時間約30-60分鐘

23. 上消化道內視鏡檢查介紹 臺安醫院健檢中心主任/胃腸肝膽科主治醫師蔡青岩 <http://www.tahsda.org.tw/newsletters/?p=1631>. Accessed 9/14/2017.

24. 內視鏡超音波檢查 | 醫療財團法人辜公亮基金會和信治癌中心醫院 <http://http://www.kfsyscc.org/cancer/cancer-treatment/care/checkup/nei-shi-jing-chao-yin-bo-jian-cha> Accessed 12/11/2017.

胰神經內分泌瘤

- 診斷(2)：
內視鏡超音波

核子醫學造影檢查

- 又稱 **octreotide** 掃描
- 由於神經內分泌腫瘤上有一種特殊的受體稱為體泌素受體，會跟 **octreotide** 結合，因此可將少量帶有放射 **octreotide** 注射入體內後進行電腦斷層攝影，與 **octreotide** 結合的腫瘤在影像上就會亮起來

正子斷層掃描

- 正子斷層掃描的方式與 **octreotide** 掃描類似，只是注射入體內的為有放射性正子標記的葡萄糖，再進行電腦斷層攝影，藉此評估腫瘤狀況。

胰神經內分泌瘤

- 診斷(3)：
生長抑素受體閃
爍成像
somatostatin-
receptor
scintigraphy

胰神經內分泌瘤

- 診斷(4):
動脈刺激肝靜脈血液採樣術
(arterial stimulation
venous sampling)

切片檢查

- 🔦 所謂切片，就是從您的**腫瘤、器官或組織**中**取出一小部份的樣本**，讓病理醫師能在顯微鏡下評估細胞是否有疾病，以利確定診斷

例如：
用針筒取出部份肝臟組織

12.Neuroendocrine Tumor - Diagnosis by Cancer.Net <http://www.cancer.net/cancer-types/neuroendocrine-tumor/diagnosis>. Accessed 9/14/2017.

13.Neuroendocrine Tumor Tests by WebMD. <http://www.webmd.com/cancer/neuroendocrine-tumors-tests#1>. Accessed 9/14/2017.

神經內分泌瘤治療的級別

神經內分泌腫瘤的預後

好

不好

第一級

第二級

第三級

級別越高 預後越差

Grading of GEP-NENs According to ENETS

G1

G2

G3

Ki67 index < 2 ≤ 2

2 **3-20**

>20

(% of positive cells per 100 counted cells[§])

Mitotic count < 2
(10 HPF)

2-20

>20

Neuroendocrine Neoplasms: NENs of the Gastroenteropancreatic (GEP) System

WHO 1980	WHO 2000	WHO 2010
I. Carcinoid	1. Well-differentiated endocrine tumor (WDET)*	1. NET G1 (carcinoid)
	2. Well-differentiated endocrine carcinoma (WDEC)*	2. NET G2*
	3. Poorly differentiated endocrine carcinoma/small cell carcinoma (PDEC)	3. NEC G3 large-cell or small-cell type
II. Mucocarcinoid III. Mixed forms carcinoid-adenocarcinoma	4. Mixed exocrine-endocrine carcinoma (MEEC)	4. Mixed adenoneuroendocrine carcinoma (MANEC)
IV. Pseudotumor lesions	5. Tumor-like lesions (TLL)	5. Hyperplastic and preneoplastic lesions
NET, neuroendocrine tumor—well differentiated; NEC, neuroendocrine carcinoma—poorly differentiated; G, Grade		
*If the Ki67 index exceeds 20%, this NET may be labeled G3.		

侷限在原發器官

侵犯鄰近器官

遠處轉移

神經內分泌瘤的預後

- 局部 > 局部侵犯與轉移 > 遠處轉移
- 分化良好 > 分化中度 > 分化不良

抽血檢查中可幫助診斷與追蹤的生物標記

如前所述，神經內分泌腫瘤是一種會分泌荷爾蒙的惡性腫瘤，會分泌與儲存各種不同胜肽與神經胺等可幫助診斷與追蹤的**生物標記**。

CgA = Chromogranin A; **5-HIAA** = 5-hydroxy-3-indoleacetic acid

14. Vinik AI, Silva MP, Woltering EA, et al. Pancreas. 2009 Nov;38(8):876-89.

CgA 做為神經內分泌腫瘤的診斷

什麼是 CgA ?

🔦 CgA是一種醣蛋白(glycoprotein) · 由神經內分泌細胞產生並釋放到血液中

為何可當成診斷的生物標記 ?

🔦 **90%** 神經內分泌腫瘤 · CgA 會**過度表現**¹
🔦 CgA 的**高專一性** (68% - 100%³)
與**高靈敏度** (60% - 90%)³

最能幫助診斷所有神經內分泌腫瘤的生物標記^{1,2}

哪些神經內分泌腫瘤的 CgA 檢測，會呈陽性反應?²

胃腸胰神經內分泌腫瘤	異位促腎上腺皮質荷爾蒙生產腫瘤
腦下垂體前頁腫瘤	神經節細胞瘤、神經母細胞瘤
副甲狀腺腫瘤	嗜鉻細胞瘤
髓樣甲狀腺瘤	小細胞肺癌
Merkel細胞瘤	攝護腺癌

現在， 有效的檢查幫助及早發現消化道 NETs

- 🔥 檢查技術進步
- 🔥 檢查儀器設備改良
- 🔥 醫師對神經內分泌腫瘤的警覺性增加

根據1988-2011年美國資料顯示：
八成消化道神經內分泌腫瘤患者，
在**腫瘤未轉移前**就發現疾病！
且**八成**以上都是屬於**惡性度較低**的期別！

8.Martin JA, Warner RR, Wisnivesky JP, et al. Eur J Cancer. 2017 May;76:197-204.

9.Yazici C, Boulay BR. World J Gastroenterol. 2017 Jul 21;23(27):4847-4855.

10.童罹神經內分泌腫瘤 腸胃鏡檢揪凶-Yahoo奇摩新聞

<https://tw.news.yahoo.com/%E7%AB%A5%E7%BD%B9%E7%A5%9E%E7%B6%93%E5%85%A7%E5%88%86%E6%B3%8C%E8%85%AB%E7%98%A4-%E8%85%B8%E8%83%83%E9%8F%A1%E6%AA%A2%E6%8F%AA%E5%87%B6-040603886.html>. Accessed 9/12/2017.

神經內分泌腫瘤的追蹤

有無神經內分泌腫瘤的症狀?

CgA 腫瘤指數追蹤

影像學檢查

治療方式

- 手術切除
- 減少腫瘤體積：手術, 電燒, 酒精注射, 栓塞, 冷凍治療
- 放射線：外射線, 放射藥物 (PRRT)
- 化學藥物
- 生物製劑與標靶藥物：

干擾素

mTOR 抑制劑

其他

Somatostatin analogs

血管生成抑制劑

神經內分泌瘤治療的內科治療原則

- 緩解性治療，非以治癒為目標。
- 治療目的：
 - 減少**功能性腫瘤**分泌賀爾蒙引起之不適症狀；
 - 減緩腫瘤引起之不適症狀（疼痛、腹脹）；
 - 延緩腫瘤惡化速度及延長存活期。

結論

- 對神經內分泌瘤的了解
- 症狀多樣, 診斷不易
- 新的診斷工具
- 多專科團隊照護的重要性

謝謝您的聆聽